

Moření česneku v roce 2006

Ing. Jan Kozák

V současné době už nedoporučujeme rozdužení na stroužky a jejich moření výhradně těsně před výsadbou, ale považujeme rovněž za správné rozdužení na stroužky a moření dříve, třeba už začátkem září. Po namoření musí být stroužky během 12 hodin vysušeny a uloženy do doby výsadby na suchém větraném místě.

Za základ moření považujeme přípravek SULKA (5%) proti vlnovníku česnekovému (proti háďátku zhoubnému téměř neúčinkuje – ale v naší sadbě háďátko není). Moří se 6 – 12 hodin (přes noc), ne déle – může dojít k popálení. Mořicí lázeň nelze použít opakovaně.

Následné moření proti houbovým chorobám je vhodné. Používá se přípravek ROVRAL FLO (0,6 – 0,8%) podobu 20 – 30 minut. My přidáváme navíc KARBEN FLO (0,2%) proti černi. Oba přípravky jsou smíchány v jedné lázni. Při opakovaném použití mořicí lázně se doporučuje její doplnění na původní objem dvojnásobnou koncentrací přípravků.

Proti fuzáriu není zatím žádné mořidlo, jedinou účinnou obranou je pozdní výsadba – nejlepší termín výsadby je den před zamrznutím.